

PROTOTIPO O PATRÓN DE LA RAZA

El concepto zootécnico y universal de raza, nos dice que es aquella población animal de una misma especie capaz de transmitir en el tiempo a sus futuras generaciones, todas aquellas características morfológicas, fisiológicas y biométricas comunes y que la diferencian del resto, siendo sus individuos indefinidamente fértiles entre sí.

Esto el hombre lo ha conseguido a través de la selección por varias generaciones, de todas aquellas características morfológicas, fisiológicas, biométricas y biomecánicas que deseamos fijar en determinada población de interés zootécnico. Para ello es determinante fijar el prototipo o patrón racial a seguir.; recordando la regla zootécnica de oro: "la función determina la forma".

El patrón se apoyara sobre las bases científicas de la genética moderna en todas sus especialidades (cuantitativa, mendeliana, de poblaciones, molecular, etc.). Igualmente deberá contemplar conceptos claros de anatomía, fisiología, teología, endocrinología y etnología.

El prototipo de la raza, debe ser revisado conforme avance la población (genotipo y fenotipo), realizándole los ajustes necesarios en el tiempo, esta actualización es la primera en 15 años. El patrón racial es, junto con el reglamento del registro genealógico, la piedra angular de la asociación de criadores.

- Este documento es oficial y vinculante con el registro genealógico
- Este prototipo racial es vinculante para todas las exposiciones de la raza.
- Ningún animal que obtenga el equivalente a un cero en cualquiera de los parámetros, según la ponderación del juez de turno, podrá ganar ningún primero ni segundo lugar de categoría en exposiciones oficiales de la raza.

*** en el caso de defectos comprobadamente adquiridos, desclasificarían al animal de las pistas de juzgamientos, no del registro genealógico; por ejemplo la ceguera adquirida, sea parcial o total.**

Parámetros	Ideal	Permitido	Descalificante
DESCRIPCIÓN GENERAL	<p>De tipo eumétrico y mesomórfico, con contextura atlética, gran fortaleza muscular y osea, conformación corporal balanceada.</p> <p>La altura mínima del macho a los 3 años de edad será de 60 pulgadas (1.52 metros) y en las hembras a los 3 años de edad 59 pulgadas (1.50 metros).</p> <p>Perfil frontonasal rectilíneo. Temperamento activo y enérgico.</p> <p>Sus movimientos son elásticos, cadenciados, extensos, de elevaciones contundentes; andar claramente definido en el trote por diagonales.</p> <p>Debiendo presentar un correcto conjunto anteroposterior de sus movimientos. Con suave asiento y correcto avance.</p> <p>Clara aptitud para la reunión, de ahí su gran versatilidad funcional.</p> <p>Evidencia de buena</p>	<p>Altura ligeramente inferior a las descritas como ideales:</p> <p>Machos mínimo 59 pulgadas y hembras 58 pulgadas; a partir de los 3 años de edad.</p>	<p>Contextura débil o excesivamente pesada.</p> <p>Temperamento Linfático. Movimientos sordos y sin energía.</p> <p>Inconsistencia del trote diagonal (precipitado, pasitrote, etc.). Trote plano o sin gesto racial.</p> <p>Tamaño pequeño según ideal. Cualquier defecto hereditario o adquirido que comprometa la belleza morfológica o alta funcionalidad.</p> <p>Cualquier señal de cirugía estética correctiva.</p>

Parámetros	Ideal	Permitido	Descalificante
		<p>irrigación y buen desarrollo muscular así como óseo.</p> <p>Claro dimorfismo sexual.</p>	
Características Funcionales			
MOVIMIENTOS	<p>Movimientos ágiles, de elevaciones contundentes (escuadra de 90 grados en remos anteriores), extensos y enérgicos, pero cadenciosos.</p> <p>Es altamente deseable la alta energía en el tren posterior (pistoneo) sin ser eléctrico, debiendo existir un correcto conjunto entre los remos torácicos y los pélvicos.</p> <p>Destacada versatilidad para diversas aptitudes, en especial la reunión.</p> <p>De andares definidos en el trote por diagonales pero con buen asiento, correcta impulsión y por ende de avance manifiesto. Siendo animales de buen fondo y resistencia.</p>	<p>Movimientos de elevaciones ligeramente por debajo del ideal (escuadra), nunca inferior a los 55 grados desde que exista un correcto conjunto e impulsión y avance.</p> <p>Trocha, aire derivado del trote, caracterizado por una ligera asincronía en los 2 tiempos diagonales.</p> <p>Oscurecerse y taparse, desde que no afecten la funcionalidad.</p>	<p>Cruzarse.</p> <p>Movimientos delanteros o traseros sordos (sin las elevaciones, extensiones y energía mínimas exigidas).</p> <p>Inconsistencia del trote diagonal ósea del bípedo diagonal de 2 tiempos, llegando al pasitrote o a la ambladura o paso huachano. Paso topino y el precipitado.</p>

Parámetros	Ideal	Permitido	Descalificante
TEMPERAMENTO		Campaneo y boleo ligero. Alcanzarse o golpearse en animales jóvenes presentados de diestro; siempre que no inter venga en la mecánica funcional o integridad física del animal.	
	Activo, energético, vivaz y noble.		Linfático o bravío.
Características Morfológicas			
PELAJE	Todas las capas con excepción de la albina, pinta u overa: piel fina y preferiblemente oscura, con pelos cortos y sedosos.	Todos los tipos de caretos y calzados.	Albinos y pintos, overos.
CABEZA	Longitud media y en proporción con el cuello, rectangular, fina y descarnada. El perfil frontonasal idóneo es el rectilíneo, con frente moderadamente ancha. Con una inserción en la	Perfil subconvexo, subcóncavo y cóncavo. Poco enjuta (ligeramente empastada). Ligero acarneramiento.	Muy pesada o desproporcionada. Femenina en el macho o masculina en la hembra (características sexuales inversas). Perfil ultraconvexo, ultracóncavo y el acarneramiento

Parámetros	Ideal	Permitido	Descalificante
	<p>fase ventral del cuello (garganta) limpia y descarnada, o sea, no abrochada.</p> <p>Masculina en el macho y femenina en la hembra.</p>		<p>pronunciado.</p> <p>Frente excesivamente ancha, estrecha o asimétrica. Inserción con el cuello excesivamente empastada (abotonado o atorado). Muy empastada.</p>
OREJAS	<p>De inserción moderadamente alta y no muy juntas, tamaño medio, con puntas ligeramente atijeradas, de movimientos activos y atentos.</p>		<p>Excesivamente pequeñas o grandes, en desproporción a su desarrollo.</p> <p>Excesivamente atijeradas. Inserción muy baja. Poca separación entre las bases (aconejadas). Muertas, gafas o caídas, doble orejas (apéndices suplementarios).</p>
OJOS	<p>Grandes, expresivos, triangulares y de color oscuro, conjuntivas pigmentadas; arcadas orbitarias levemente marcadas.</p>	<p>Ligeramente pequeños, desde que mantengan visión estereoscópica.</p> <p>Ligeramente</p>	<p>Muy juntos o frontales (no estereoscópicos). Ceguera bilateral y unilateral.</p> <p>Somnolientos.</p> <p>Exoftalmia (saltones o</p>

Parámetros	Ideal	Permitido	Descalificante
HOCICO	Mirada despierta y atenta, de visión estereoscópica.	redondeados o achinados.	de pescado).
	Proporcional al resto de la cabeza. Recto, más ancho y corto en el macho que en la hembra. Descarnado y sano tanto fisiológica como anatómicamente.	Ligero acarneramiento Ligera exostosis.	Desvíos, torsiones y sobrehuesos (exostosis). Caracteres sexuales inversos.
FOSAS NASALES	Amplias y funcionales, dilatadas bajo ritmo de trabajo, denotando gran capacidad de oxigenación.		Estrechas, pocos funcionales.
BOCA	De moderada amplitud y correcta articulación (mordida), con labios fuertes y firmes; el labio superior ligeramente proyectado sobre el inferior. Piezas dentales normales según cronología dentaria.		Labio inferior caído (rezador). Prognatismo e agnatismo. Excesivamente pequeña.
	De longitud media hacia ligeramente largo, de forma piramidal y arqueado. Musculoso, principalmente en el macho, perfil ventral ligeramente cóncavo y el dorsal convexo. Crines abundantes y finas.	Moderadamente corto o largo. Moderadamente poco arqueado. Perfil ventral Rectilíneo. Crines no muy espesas, crines gruesas en el	Muy largo o corto. Morro caído o vencido. Aciervado e invertido. Golpe de hacha. Poco musculoso (fino) en el macho. Muy musculoso en la hembra (cargado). Sin arqueo
CUELLO			

Parámetros	Ideal	Permitido	Descalificante
CRUZ	Correcta inserción en su misión con el tronco, o sea con las cruces, tórax, hombros y espaldas.	macho. Ligera falta de firmeza en el morrillo.	(completamente rectilíneo). Crines groseras en la hembra.
	Moderadamente ancha, musculada y manifiesta o destacada.	Poco musculada en la hembra.	Muy alta o muy plana. Estrecha.
TRONCO	<p>Desarrollado, robusto, musculoso, con costillas moderadamente arqueadas y largas dando buena profundidad y fortaleza.</p> <p>Pecho ancho, profundo y musculado, principalmente en el macho.</p> <p>Espaldas oblicuas (escápulas), fuertes y relativamente largas.</p> <p>Dorsolomo musculoso, corto y recto, de suave inserción uno en el otro; moderadamente ancho.</p> <p>Inserción discreta y fuerte con la grupa.</p> <p>Línea ventral paralela a la dorsolumbar.</p>	<p>Dorso lomo relativamente largo, pero sin evidencia de lordosis (pando) o debilidades. Ligera lordosis en yeguas de 10 o más años, así mismo presencia de vientre de "vaca" en dichas yeguas de avanzada gestación o edad.</p>	<p>Débil, con poco desarrollo y desproporción. Pecho estrecho y costillar no arqueado. Poco musculoso en el macho, hilado (cocido de riñones, vientre de galgo o hijares comprimidos. Vientre voluminoso (vaca), no atlético, con excepción de hembras gestantes o avanzadas de edad.</p> <p>Presencia de lordosis, (pando), sifosis (lomo de carpa) y escoliosis.</p> <p>Espaldas (escápulas) muy verticales.</p>

Parámetros	Ideal	Permitido	Descalificante
GRUPA Y COLA	<p>De longitud y amplitud media, redondeada en las nalgas, levemente inclinada. Con musculatura firme, densa y evidente en los muslos y nalgas.</p> <p>Las puntas del ilion (ancas o cadera) estarán en armonía con los isquiones (puntas de nalga), y éstos bien separados entre sí, proporcionándole amplitud y firmeza a la pelvis.</p> <p>La cola debe tener una suave y harmónica inserción en la grupa. Arriba de los 36 meses presentará crines pobladas y largas; durante la marcha se mantendrá en reposo y descansando entre los ísquiones.</p>	<p>Horizontal. No muy musculada en la hembra desde que sea amplia y correcta.</p>	<p>Derribada o escurrida.</p> <p>Estrecha. Muy corta.</p> <p>Arriba de la horizontal.</p> <p>Ancas evidentemente asimétricas o desniveladas.</p> <p>(Lunanco). Problemas de tornillo de centro (debilidad en vértebras lumbares). Movimiento oscilatorio de la pelvis durante la marcha.</p> <p>Falta de Firmeza.</p>
MIEMBROS TORAXICOS (ANTERIORES)	<p>Brazos y antebrazos en ángulo armonioso con las espaldas; antebrazos y brazos correctamente dirigidos y fuertes.</p> <p>Tendones limpios, demarcados y fuertes.</p> <p>Rodillas enjutas y planas, cañas gruesas, de medianas a largas;</p>	<p>Antebrazo y brazo con relativa poca musculatura en las hembras.</p> <p>Elevaciones un poco menos contundentes y enérgicas; desde que sea seguida de la extensión requerida para un</p>	<p>Poco músculo en las espaldas, brazos y antebrazos en los machos.</p> <p>Rodillas empastadas, con sobrehuesos, invertidas, vencidas, lesiones de importancia.</p> <p>Presencia de gomas.</p>

Parámetros	Ideal	Permitido	Descalificante
<p>MIEMBROS PELVÍCOS O POSTERIORES</p>	<p>menudillos secos y robustos.</p> <p>Cuartillas de largura media, con ángulo aprox.mado a los 50 grados.</p> <p>Deben mostrar al accionar en el aire de trote, una contundente flexión y elevación (90 grados), debiendo ser elástica, enérgica pero cadenciosa.</p> <p>Buen avance, una vez el animal impulsado por el posterior. Deben presentar un correcto conjunto con los remos posteriores</p> <p>Aplomos perpendiculares a la horizontal, sin desvíos comprometedores. Deben evidenciar fuerte estructura ósea.</p>	<p>avance al menos moderado.</p> <p>Cañas ligeramente delgadas en la hembra y animales menores de 3 años.</p> <p>Presencia de boleo ligero siempre que no afecte la mecánica.</p>	<p>Presencia de Tendinitis.</p> <p>Presencia de sobrehuesos importantes que afecten la funcionalidad o resistencia.</p> <p>Cualquier señal de debilidad estructural funcional.</p> <p>Cuartillas excesivamente cortas o largas.</p> <p>Tendones degollados.</p> <p>Ángulo de cuartillas inferior a 40 grados (vencidas o sentado).</p> <p>Cañas muy delgadas o muy cortas en proporción al cuerpo.</p> <p>Aplomos con desvíos de la vertical tanto frontal como lateralmente.</p>
	<p>Muslos largos y musculosos, nalgas</p>	<p>Base ósea, relativamente más</p>	<p>Corvejones rectos</p>

Parámetros	Ideal	Permitido	Descalificante
	<p>redondeadas y musculadas, piernas largas y fuertemente musculadas, corvejones secos, fuertes, ligeramente acodados, separados, paralelos en su línea de aplomos y perpendiculares al suelo.</p> <p>Rótulas musculosas y firmes.</p> <p>Cuartillas de largo medio, fuertes, flexibles y en ángulo de 45 a 50 grados.</p> <p>De movimientos enérgicos, no eléctricos, elásticos, de buen pistoneo, dando magnífica impulsión y avance al remeterse debidamente bajo la masa.</p> <p>Buen conjunto con los movimientos de los anteriores.</p> <p>Los corvejones al trote, deben alcanzar ojala casi la escuadra en su elevación.</p>	<p>delgada en las hembras.</p> <p>Ligeros desvíos en los aplomos desde que no afecten ni la función ni la fortaleza del caballo.</p> <p>Poco pistoneo desde que los posteriores se remetan bajo la masa lo mínimo necesario para una debida impulsión y avance</p>	<p>(amulados).</p> <p>Ángulo interno de corvejones muy cerrado (sentado de corvejones)</p> <p>Pobre desarrollo muscular en muslos y piernas principalmente en el macho.</p> <p>Cuartillas excesivamente largas o cortas.</p> <p>Cuartillas vencidas (ángulo menor a 40 grados).</p> <p>Estructura ósea fina o muy grosera.</p> <p>Desvíos de aplomos severos (abrochados, etc.).</p> <p>Presencia de gomas, sobrehuesos, tendinitis, etc., que denoten algún tipo de debilidad.</p>

Parámetros	Ideal	Permitido	Descalificante
CASCOS	<p>Deben evidenciar fuerte estructura ósea e irrigación así como perfección en sus aplomos.</p> <p>Ambos miembros deben presentarse sanos.</p>		<p>Patela, esperaván, mal de cuerda o calambres sean al paso o al trote, cuando altere la mecánica normal de la raza.</p>
	<p>Sanos, fuertes y en proporción con el desarrollo del animal para un buen apoyo. Con una muralla alta, sana y fuerte; talones altos.</p> <p>Preferiblemente de tonalidad oscura y tamaño medio, redondeados y anchos, con la diferencia de forma natural existente entre los anteriores y los posteriores.</p> <p>Presentando la suela, las barras y los andados correctos, amplios y sanos.</p>	<p>Relativamente más pequeño en las hembras desde que sean redondeados y no estrechos.</p> <p>Claros o rayados, desde que estén sanos.</p> <p>Ligero campaneó, desde que no afecte la mecánica funcional de la articulación y miembro.</p> <p>Cascos alongados, desde que no afecten la base ósea de este, ni el eje de cuartillas.</p>	<p>Muy pequeños.</p> <p>Estrechos.</p> <p>Lesiones importantes o señales de debilidad que comprometan la funcionalidad del remo o del apoyo.</p> <p>Eje roto (casco, cuartilla)</p>

Parámetros	Ideal	Permitido	Descalificante
TESTICULOS	En los potros de más de 36 meses, deben ser de buena circunferencia, consistencia fibroelastica, correcto desarrollo y simetría. Ambos deben estar presentes en la bolsa escrotal.	Pequeña asimetría. Ligeramente pequeños.	Hipoplásico uni o bilateral. Asimetrías importantes. Criptor y monorquidismo. subdesarrollo para la edad (pequeños) Orquitis. Falta de consistencia (degeneración testicular).
PENE	De largura y grosor acorde con la edad del potro. De apariencia sana.		Infantilismo. Tumores y ulceraciones. Adherencias o deformaciones. Bananitis y acrobustitis
VULVA	Buen desarrollo de acuerdo a la edad de la hembra. De apariencia saludable.	Relativamente pequeña en potras.	Infantilismo.
UBRE	De buen volumen según la edad y estado reproductivo de la yegua, con dos tetas		Ubre infantil. Tetas ciegas o no

Parámetros	Ideal	Permitido	Descalificante
	<p>funcionales de pequeñas a medianas; separadas entre si, con ambas medias ubres funcionales y sanas.</p>		<p>funcionales.</p> <p>Tetas excesivamente pequeñas o grandes.</p> <p>Cisterna y medias ubres poco funcionales o lesionadas.</p>